

Calendario de vacunación sugerido 2017 – Departamento de Pediatría – CEMIC – Hospital Universitario

Edad	BCG	Hepatitis B	Séxtuple (1) DTPa- Hib- HB-IPV	Neumococo conjugada	Hepatitis A	Sabin	Triple viral	DPT/dTpa/ dT	Rotavirus Rotarix®/ Rotateq®	Cuádruple DPT-Hib	Varicela	Meningococo		VPH	Edad (7)
												Meningococo B (6) (Esquema a confirmar)	Conjugada cuadrivalente		
RN	Unica	1ª dosis													RN
2m			1ª dosis	1ª dosis					1ª dosis						2m
3m															3m
4m			2ª dosis	2ª dosis					2ª dosis						4m
5m															5m
6m			3ª dosis	3ª dosis (2)					3ª dosis (RotaTeq®)						6m
12m				Refuerzo	1ª dosis						1ª dosis				12m
15m															15m
18m					2ª dosis	1 Refuerzo					Refuerzo				18m
2 años															2 años
5 a 6 años						Refuerzo (3)	2ª dosis	DPT (3)			2ª dosis (5)	Niños de 6 a 23 m : 2 dosis + refuerzo > 2 años 2 dosis	1 dosis en niños > 2 años - 2 dosis en > 2 años de grupo de riesgo		5 a 6 años
11 años (*)								dTpa (4)							11-14: 2 dosis. ≥ 15 3 dosis
C/ 10 años								dT							C/ 10 años

(1) Infanrix hexa®, Hexaxim®; otra alternativa es Pentaxim® + hepatitis B. (2) En huéspedes especiales (niños pretérminos inmunocomprometidos, VIH) el esquema básico son 3 dosis.

(3) Tetraxim® (DTPa +IPV) como alternativa de Sabin + DPT. No se debería aplicar Adacel® o Bustrix® ya que tiene menor componente diftérico].

(4) Adacel® o Bustrix®; (5) La segunda dosis de varicela está recomendada. (6) Vacuna de vacunología reversa pendiente de aprobación por ANMAT en el año 2017.

(7) Ver lineamientos para vacunas en huéspedes especiales en bibliografía correspondiente. (*) Recordar vacunación de *catch-up* en niños que no tengan esquema de hepatitis B o triple viral completos.

Vacuna de Virus de Papiloma Humano - VPH

	Cervarix® *	Gardasil® *
Mujeres	A partir de 11 años **	A partir de 11 años **
Varones		A partir de 11 años **
Esquema ≥15	0 – 1 y 6 meses ***	0 – 2 y 6 meses ***

(*) No son intercambiables. (**) En caso de abuso sexual puede indicarse a partir de los 9 años. (***) De 11-14 años, esquema 0-6 meses.

Vacuna antigripal

Edad	Dosis	Cantidad
6 m - 3 años	0.25 ml	1 o 2 dosis (*)
3 - 8 años	0.5ml	1 o 2 dosis (*)
≥ 9 años	0.5ml	1 dosis

(*) Se aplica 2 dosis en el primer año de vacunación antigripal trivalente.

Indicaciones:

Embarazadas; Puérperas en puerperio inmediato; 6 a 24 meses; 2 años a 64 años con factores de riesgo; Adultos ≥ 65 años; Personal de salud. Idealmente debe indicarse en marzo y abril.

Vacuna neumocócica conjugada 13 valente - Prevenar 13®

2 a 11 meses	2 dosis + 1 refuerzo a los 12 meses
12 a 23 meses	1 dosis + 1 refuerzo
2 a 5 años	1 dosis
2 a 18 años con factores de riesgo	2 dosis

Intervalo entre dosis mínimo 8 semanas y en menores de 12 meses es de 4 semanas.

No se indica rutinariamente en niños mayores de 5 años.

No son intercambiables las dos marcas comerciales en el esquema primario.

Vacuna neumocócica conjugada 10 valente + HNT - Synflorix®

2-6 meses	2 dosis + 1 refuerzo a los 12 meses
7 a 11 meses	2 dosis + 1 refuerzo durante el segundo año de vida (con un intervalo mínimo de 2 meses)
12 meses a 5 años	2 dosis con al menos 2 meses de intervalo interdosis.

Infanrix hexa®	DTPa, IPV, Hib, HB
Hexaxim®	
Pentaxim®	DTPa, IPV, Hib
Adacel®	dTpa
Bustrix®	
Tetraxim®	DTPa, IPV
Synflorix®	Neumocócica conjugada
Prevenar 13®	
Engerix B®	Hepatitis B
Hepativax®	
Biovac HB®	
HBvax Pro®	
Avaxim®	Hepatitis A
Havrix®	
Virohep A®	
Vaqta®	
Varilrix®	Varicela
Varivax®	
Bexsero®	Meningococo B
Menveo®	Meningocócica conjugada cuadrivalente
Menactra® *	
MMRII®	Sarampión, rubéola, paperas
Trimovax®	

(*) A partir de 9 meses.